

Vaccination contre la COVID-19 : Point d'utilisation du vaccin <u>adulte mono et bivalent</u> COMIRNATY® 30 μg/dose de

Pfizer BioNTech *forme prête à l'emploi- boucho



Phase 1 : température froide

: température ambiante

7

Stockage initial

Décongélation initiale

Transport

Stockage secondaire





Produit à décongeler entre 2 à 8°C ou à température ambiante jusqu'à 30°C





Administration

Conserver dans l'emballage


et à l'abri de la lumière

Le flacon de vaccin est prêt à l'emploi. Ne pas diluer avant utilisation.

Mélanger délicatement en retournant le flacon à 10 reprises. Ne pas secouer



Bouchon gris Après mélange : aspect de dispersion couleur blanche à blanc cassé, exempte de toute particule visible



Flacon multidose (2,25 mL)



seringues à faible volume mort



Administration INTRA-MUSCULAIRE



Une fois le flacon ouvert : stable 12h de 2 à 30°C (avec un transport de 6h maximum)

Traçabilité chaîne du froid

- Décongélation
 - Date et Heure de sortie -80°C
 - Date et Heure de péremption (10 semaines)
- Transport
 - Date et Heure de départ
 - Date et Heure de réception
- Administration
 - Date et Heure de percussion
 - Date et Heure de péremption (12h)

Contact: ars-ara-omedit@ars.sante.fr

Liens: https://www.ema.europa.eu/en/news/more-flexible-storage-conditionsbiontechpfizers-covid-19-vaccine, Comirnaty, INN-tozinameran, tozinameran/riltozinameran, tozinameran/famtozinameran (europa.eu) -

MesVaccins.net

Date de création : 26/01/2023 - Date de dernière MAJ : 26/01/2023