

Vaccins contre les méningocoques



Soyons acteurs dans la prévention

500 à 600 pers/an touchées par une infection invasive à méningocoque

Les **méningocoques B**, **W** et **Y** sont les plus fréquents en France

Contamination par contact proche et prolongé avec un porteur

La vaccination contre les sérogroupes

ACWY remplace celle obligatoire contre le sérogroupe C

Quels vaccins en France?



Nimenrix [®]	MenQuadfi [®]	Menveo®	Bexsero®	Trumenba®
Sérogroupes A, C, Y, W			Sérogroupe B	
Conjugué			Protéique	
A partir de	A partir de	A partir de	A partir de	A partir de 10
6 semaines	12 mois	2 ans	2 mois	ans

Recommandations générales

Sérogroupes	Nourrissons	Adolescents et jeunes adultes (11-24 ans)
A, C, W et Y	Vaccination <u>tétravalente</u> obligatoire Nimenrix®, Menquadfi® ou Menveo®*: 1 dose unique de primovaccination à M6 + rappel à M12. Extension jusqu'à 2 ans: 1 dose unique après M12. Rattrapage vaccinal jusqu'à 4 ans (révolus) chez les enfants non vaccinés contre les sérogroupes ACWY et ceux vaccinés avec 2 doses contre le sérogroupe C (mesure transitoire 2025): 1 dose unique.	Vaccination <u>tétravalente</u> recommandée Nimenrix®, Menquadfi® ou Menveo®: 1 dose entre 11 et 14 ans, indépendamment du statut vaccinal. Rattrapage recommandé chez les 15-24 ans: Campagne de rattrapage vaccinal sur 2 ans.
В	 Vaccination obligatoire Bexsero®: 1 dose à M3 et M5 + rappel à M12 (vaccination possible jusqu'à 2 ans). Rattrapage vaccinal jusqu'à 5 ans chez les enfants non vaccinés (mesure transitoire du 2025): À partir de 1 ans, schéma à 2 doses en respectant un intervalle min d'1 mois entre les doses 	Ne pas élargir à tous les adolescents la vaccination dirigée contre le sérogroupe B Rendre effectif le remboursement de la vaccination dirigée contre le sérogroupe B à partir de 15 ans, chez les 15 à 24 ans souhaitant se faire vacciner.

*Les vaccins Nimenrix® ou Menquadfi® peuvent être utilisés pour l'administration de la dose de rappel à l'âge de 12 mois chez les nourrissons primovaccinés avec le vaccin Nimenrix® avant 12 mois.

M = Mois

Recommandations particulières

Chez les personnes à risque : Sérogroupes : ACWY + B

ACWY: Nimenrix®

- De 6 semaines à moins de 6 mois : 2 doses de Nimenrix® en respectant un intervalle de 2 mois entre les doses et 1 dose de rappel à l'âge de 12 mois
- **De 6 à 12 mois** :** 1 dose de Nimenrix® et rappel à l'âge de 12 mois
- ACWY: Nimenrix®, MenQuadfi® et Menveo®
- Après 12 mois**: 1 dose unique Nimenrix® ou de MenQuadfi® (ou Menveo® après 2 ans)

B: Bexsero^{®***}:

- Avant 2 ans : recommandations générales
- A partir de 2 ans : 2 doses espacées d'au moins 1 mois

Ou Trumenba®***:

A partir de 10 ans : 2 doses espacées de 6 mois
 (M0M6) ou 2 doses espacées d'au moins 1 mois + 1 dose au moins 4 mois après la 2ème dose

Rappel ACWY et B recommandé tous les 5 ans

Vaccination de l'entourage et des sujets contacts le cas échéant

- ** Respecter un délai de 1 mois entre la vaccination avec le Nimenrix® et le Neisvac10® ou Menjugate®
- *** Pas de recommandation préférentielle entre les vaccins Trumenba® et Bexsero® mais ils ne sont pas interchangeables en cours de schéma

Population à risque

- Déficit en fraction terminale du complément
- Traitement anti-complément
- Déficit en properdine
- Asplénie anatomique ou fonctionnelle
- Greffe de cellules souches hématopoïétiques
- Personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le méningocoque

Vaccinons!




Population à risque



Hospitalisations



Nourrissons : population la plus vulnérable aux infections invasives à méningocoque (IIM)



Contact: ars-ara-omedit@ars.sante.fr Sources: Calendrier vaccinal 2025, Santé publique France, Vaccination Info Service, HAS mars 2025 Version n°5: 03/10/2025