


Vaccin rougeole

Chiffres clés

- En France **117 cas déclarés en 2023** (multipliés par 8 par rapport à 2022)
- Près de **100%** d'efficacité après deux doses de vaccins
- Baisse de **62 % des décès** dans le monde entre 2000 et 2019 grâce à la vaccination
- 15 à 20 personnes** peuvent être contaminées par une personne infectée



Incidence annuelle* et nombre de cas de rougeole déclaré par département* de résidence, 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 (n = 86 cas)



Recommandations vaccinales

Générales

Deux doses pour un schéma vaccinal complet
intervalle minimal d'un mois entre les doses de vaccin trivalent

Enfants nés après le 1^{er} janvier 2018

Enfants de plus de 18 mois, adolescents et adultes nés depuis 1980

1^{ère} dose du vaccin trivalent ROR* à 12 mois

2 doses avec un délai minimum d'un mois entre les doses si aucune vaccination antérieure

2^{ème} dose** entre 16 et 18 mois

2^{ème} dose si 1 seule dose reçue par le passé
(3 doses de vaccin au total si première dose de vaccin reçue avant l'âge de 12 mois)

Particulières

Milieu professionnel*

Schéma 2 doses :

- Professionnels de santé
- Personnes travaillant dans les services accueillant des patients à risque de rougeole grave
- Personnels de la petite enfance

Voyageurs

- Chez les **nourrissons dès 6 mois**
→ 1 dose avec un rappel à 12 et 18 mois
(Enfants à partir de 12 mois : suivre les recommandations générales)
- Personnes **de > 18 mois et nés après 1980** → Rattrapage pour obtenir 2 doses au total de vaccin trivalent (Si 1^{ère} dose administrée avant l'âge de 12 mois alors 3^{ème} dose nécessaire)
- Personnes **nés avant 1980** sans antécédent ou non vaccinées → 1 dose de vaccin trivalent

Autour d'un cas de rougeole

- Nourrissons de 6 à 11 mois** : 1 dose de vaccin trivalent dans les 72h puis une dose à 12 mois et 1 dose entre 16 et 18 mois
- Personnes de > 1 an et nées après 1980** : mise à jour pour atteindre 2 doses selon recommandations générales (voire 3 doses pour les personnes ayant initié leur vaccination avant l'âge de 12 mois)
- Dans les **72 heures** qui suivent le contage

*ROR : Rougeole Oreillons Rubéole

**La 1^{ère} et la 2^{ème} dose peuvent être effectuées avec des vaccins différents (voir RCP)

Quelles sont les contre-indications aux vaccins ?

- Grossesse
 - Déficit immunitaire acquis ou congénital ou traitements immunosuppresseurs
 - Allergies à l'un des constituants, ou à la Néomycine
 - Tuberculose active non traitée (voir RCP MM Rvaxpro®)
- La vaccination doit être différée en cas de maladie aiguë avec fièvre

Si les antécédents d'infection ou de vaccination sont incertains, que faire ?

- Les personnes nées après 1980 n'ayant plus leur carnet de santé sont considérées comme non protégées contre la rougeole
- il est recommandé de vacciner avec 2 doses
- Aucun risque à vacciner une personne déjà immunisée

Quand sommes nous contagieux ?

- La période de contagion commence **5 jours avant l'éruption cutanée** et dure jusqu'à **5 jours après** le début de l'éruption.

Quels vaccins en France ?

PRIORIX®

M-M-RVAXPRO®

Vaccin trivalent : ROR®
Sous-cutanée ou Intramusculaire
Conservation entre +2 et +8 C (pas de congélation)
A utiliser dans les 8 heures suivant la reconstitution

Vaccin vivant atténué
A partir de 9 mois

Vaccinons à l'hôpital



Identifier les patients non vaccinés



Proposer la vaccination



Protéger les plus fragiles : femmes enceintes et nourrissons de < 1an

Epidémie de rougeole