

Vaccins contre les méningocoques

Soyons acteurs dans la prévention

500 pers/an touchées par une **infection invasive à méningocoque (IIM)**

Principaux sérogroupes en cause sont : **A, B, C, W, Y**

Contamination par **contact** proche et prolongé avec un porteur

> 90% d'efficacité des vaccins conjugués C chez les nourrissons

Quels vaccins en France ?



Nimenrix®	MenQuadfi®	Menveo®	Menjugate10® / Neisvac®	Bexsero®	Trumenba®
Sérogroupes A, C, Y, W Conjugué			Sérogroupe C Conjugué	Sérogroupe B Protéique	
A partir de 6 semaines	A partir de 12 mois	A partir de 2 ans	A partir de 2 mois	A partir de 2 mois	A partir de 10 ans

Recommandations générales

Sérogroupes

Nourrissons

Adolescents et jeunes adultes (11-24 ans)

A, C, W et Y

Vaccination tétravalente obligatoire Nimenrix®*

- 1 dose unique de primovaccination à 6 mois + rappel à 12 mois.

Vaccination tétravalente recommandée Nimenrix®, Menquadfi® ou Menveo®

- 1 dose entre 11 et 14 ans, indépendamment du statut vaccinal.
- Rattrapage recommandé chez les 15-24 ans.

B

Vaccination obligatoire Bexsero®

- 1 dose à 3 mois et 5 mois + rappel à 12 mois.

Ne pas élargir à tous les adolescents la vaccination dirigée contre le séro groupe B

*Tout schéma vaccinal initié avec le vaccin Nimenrix® devra être complété avec ce même vaccin.

Recommandations particulières

Chez les **personnes à risque : Sérogroupes : ACWY + B**

ACWY: Nimenrix®

- De 6 semaines à moins de 6 mois : 2 doses de Nimenrix® en respectant un intervalle de 2 mois entre les doses et 1 dose de rappel à l'âge de 12 mois
- De 6 à 12 mois** : 1 dose de Nimenrix® et rappel à l'âge de 12 mois

ACWY: Nimenrix®, MenQuadfi® et Menveo®

- Après 12 mois** : 1 dose unique Nimenrix® ou de MenQuadfi® (ou Menveo® après 2 ans)

+

B: Bexsero®*** :

- Avant 2 ans : recommandations générales
- A partir de 2 ans : 2 doses espacées d'au moins 1 mois

Ou Trumenba®***:

- A partir de 10 ans : 2 doses espacées de 6 mois (MOM6) ou 2 doses espacées d'au moins 1 mois + 1 dose au moins 4 mois après la 2^{ème} dose

+

Rappel ACWY et B recommandé **tous les 5 ans**

Vaccination de l'entourage et des sujets contacts le cas échéant

M = Mois

** Respecter un délai de 1 mois entre la vaccination avec le Nimenrix® et le Neisvac10® ou Menjugate®

*** Pas de recommandation préférentielle entre les vaccins Trumenba® et Bexsero® mais ils ne sont pas interchangeables en cours de schéma

Population à risque

- Déficit en fraction terminale du complément
- Traitement anti-complément
- Déficit en properdine
- Asplénie anatomique ou fonctionnelle
- Greffe de cellules souches hématopoïétiques
- Personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le méningocoque


Vaccinons !



Population à risque



Nourrissons : population la plus vulnérable aux infections invasives à méningocoque (IIM)



Hospitalisations

IIM et complications dont le purpura fulminans