



## Vaccin rougeole

### Chiffres clés



### Incidence annuelle\* et nombre de cas de rougeole déclaré par département\* de résidence, 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023 (n = 86 cas)



### Recommandations vaccinales

#### Générales

Deux doses pour un schéma vaccinal complet

Enfants nés après le 1<sup>er</sup> janvier 2018

Enfants de plus de 18 mois, adolescents et adultes nés depuis 1980

1<sup>ère</sup> dose du vaccin trivalent ROR\* à 12 mois

2 doses avec un délai minimum d'un mois entre les doses si aucune vaccination antérieure

2<sup>ème</sup> dose\*\* entre 16 et 18 mois

2<sup>ème</sup> dose si 1 seule dose reçue par le passé

\*ROR : Rougeole Oreillons Rubéole

\*\*La 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> dose peuvent être effectuées avec des vaccins différents (voir RCP)

#### Particulières

##### Milieu professionnel\*

##### Schéma 2 doses :

- ❖ Professionnels de santé
- ❖ Personnes travaillant dans les services accueillant des patients à risque de rougeole grave
- ❖ Personnels de la petite enfance

##### Voyageurs

- ❖ Chez les **nourrissons dès 6 mois**  
→ 1 dose avec un rappel à 12 et 18 mois  
(Enfants à partir de 12 mois : suivre les recommandations générales)
- ❖ Personnes **de > 18 mois et nés après 1980** → Rattrapage pour obtenir 2 doses au total de vaccin trivalent (Si 1<sup>ère</sup> dose administrée avant l'âge de 12 mois alors 3<sup>ème</sup> dose nécessaire)
- ❖ Personnes **nés avant 1980** sans antécédent ou non vaccinées → 1 dose de vaccin trivalent

##### Autour d'un cas de rougeole

- ❖ **Nourrissons de 6 à 11 mois** : 1 dose de vaccin trivalent dans les 72h puis une dose à 12 mois et 1 dose entre 16 et 18 mois
- ❖ **Personnes de > 1 an et nées après 1980** : mise à jour pour atteindre 2 doses selon recommandations générales
- ❖ Dans les **72 heures** qui suivent le contage

#### Quelles sont les contre-indications aux vaccins ?

- ❖ **Grossesse**
- ❖ **Déficit immunitaire** acquis ou congénital ou traitements immunosuppresseurs
- ❖ **Allergies** à l'un des constituants, ou à la Néomycine
- ❖ Tuberculose active non traitée (voir RCP MM Rvaxpro®)

La vaccination doit être différée en cas de maladie aiguë avec fièvre

#### Si les antécédents d'infection ou de vaccination sont incertains, que faire ?

- ❖ Les personnes nées après 1980 n'ayant plus leur carnet de santé sont considérées comme non protégées contre la rougeole
- il est recommandé de vacciner avec 2 doses
- ❖ **Aucun risque à vacciner une personne déjà immunisée**

#### Quand sommes nous contagieux ?

- ❖ La période de contagion commence **5 jours avant l'éruption cutanée** et dure jusqu'à **5 jours après** le début de l'éruption.

### Quels vaccins en France ?

**PRIORIX®**

**M-M-RVAXPRO®**

Vaccin trivalent : ROR®  
Sous-cutanée ou Intramusculaire  
Conservation entre +2 et +8 C (pas de congélation)  
A utiliser **dans les 8 heures** suivant la reconstitution  
Vaccin **vivant atténué**  
A partir de **9 mois**

### Vaccinons à l'hôpital



Identifier les patients non vaccinés



Proposer la vaccination



Protéger les plus fragiles : femmes enceintes et nourrissons de < 1an

Epidémie de rougeole