



VACCINS

P = Vaccin COMIRNATY® Pédiatrique Pfizer



DOSES

D1 = 1^{er} dose

D2 = 2^{ème} dose

D1 = D2 = 0,2 ml de solution après dilution (10 µg)

Date de création : 10/02/2022

Version n°2 : 16/02/2022

Avant la vaccination :

- Entretien médical pour écarter une contre indication et prescrire la vaccination
- Formulaire d'autorisation parental signé par au moins un des deux parents : Disponible [ici](#)
- La réalisation d'un TROD (test rapide d'orientation diagnostique), en l'absence d'antécédent connu et documenté de Covid-19, est recommandée afin de limiter l'administration du vaccin à une seule dose en cas de test positif

 **Attention au RISQUE DE CONFUSION Vaccin COMIRNATY® Adulte et Vaccin COMIRNATY® Pédiatrique**

Le vaccin COMIRNATY Pédiatrique a un bouchon **ORANGE**
Les modalités de stockage, dilution et préparation des vaccins COMIRNATY Pédiatrique sont synthétisées sur notre [Fiche Utilisation du vaccin COMIRNATY® 10µg](#)

Quand réaliser un TROD ?

L'utilisation des TROD sérologiques est recommandée pour tous les enfants de 5 à 11 ans exceptés ceux disposant d'une preuve d'infection passée au Covid-19 (résultat de test PCR, antigénique ou sérologique datant de plus de 2 mois)

→ Bonne pratique d'utilisation et lecture des résultats: [ici](#)

- Un délai de 2 mois doit être respecté entre une infection au SARS-CoV-2 et une vaccination.
- Une fois le délai de 2 mois passé, sur présentation de la preuve d'infection passée ou du résultat positif du TROD, un schéma monodose sera proposé à l'enfant

Schéma de vaccination



Jamais infecté par SarsCoV2



Infecté par SarsCoV2 avant la première injection



Infecté par SarsCoV2 après la première injection



Vaccination concomitante :

Selon l'avis du 6 décembre 2021 du COSV* : recommandation, chaque fois que justifié, de la combinaison du vaccin anti-Covid-19 et des vaccins suivants:
- Rappels contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche des enfants âgés de 6 à 11 ans ;
- Vaccin anti- HPV pour les enfants de 11 ans

* Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale

Sources :

- Vaccination contre le Covid-19 des 5-11 ans – Site du Ministère des solidarités et de la santé
- Portfolio « vaccination anti-covid des enfants de 5 à 11ans » - Ministère des solidarités et de la santé
- Intégration du TROD sérologique dans le parcours vaccinal - Ministère des solidarités et de la santé
- DGS-URGENT N°2021_133 : Ouverture de la campagne de vaccination contre le covid-19 à tous les Enfants âgés de 5 à 11 ans
- Avis du 6 décembre 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie : Vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans