



Vaccination et Grossesse

Soyons acteurs dans la prévention



51% des cas de **coqueluche** concernent les **nourrissons de moins de 3 mois**

9 cas de coqueluche sur 10 font l'objet d'une hospitalisation.

Avec la vaccination, les décès par **rougeole** dans le monde ont chuté de près de **62 %** entre 2000 et 2019

La **varicelle** au cours des 4 premiers mois de grossesse peut être responsable de **malformations congénitales**.

OBJECTIFS



Identifier les patients non vaccinés, les femmes avec projet de grossesse



Protéger les femmes enceintes et nourrissons de < 1an



Proposer la vaccination



Réduire le risque de contamination



Réduire le risque de forme grave chez la femme enceinte

Avant la grossesse

ROUGEOLE-RUBÉOLE-OREILLONS (ROR)

= PRIORIX® ou M-M-RVAXPRO®

Toute personne née après 1980 a reçu **2 doses** de vaccin ROR (obligatoire)

VARICELLE

En l'absence d'immunité, **2 doses** de vaccins espacées de :

- 4 à 8 semaines pour le VARIVAX®
- 6 à 10 semaines pour le VARILRIX®



Il s'agit de vaccins à virus vivant atténué

Ils sont contre indiqués pendant la grossesse

! Délai d'un mois minimum nécessaire entre la vaccination et le début d'une grossesse

COQUELUCHE

= REPEVAX® ou BOOSTRIX TETRA®

= vaccin **tétravalent** inactivé dTcaPolio

Chez l'adulte : combiné au vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite est recommandé systématiquement à l'âge de 25 ans



Prescription par le médecin ou la sage femme

Pendant la grossesse

COVID

= COMIRNATY® ou SPIKEVAX®

= Vaccins à ARN messenger

En cas d'absence de vaccination avant la grossesse, la vaccination est recommandée **dès le 1^{er} trimestre** de la grossesse

GRIPPE

La vaccination contre la grippe est recommandée aux femmes enceintes, **quelque soit le stade de la grossesse**

COQUELUCHE

A partir du 2^{ème} trimestre de grossesse: si possible entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée.

Vacciner la femme à chacune de ses grossesses



Protection du nouveau-né grâce au passage transplacentaire des anticorps de la mère.

Stratégie de cocooning

COQUELUCHE : vaccination en post-partum de la mère si non vaccinée pendant la grossesse

+ vaccination de l'entourage



1 dose de vaccin dTcaPolio pour les personnes non antérieurement vaccinées
1 dose de rappel pour les - de 25ans si la dernière injection date de plus de 5ans
1 dose de rappel pour les + de 25ans si dernière injection date de plus de 10ans

GRIPPE : recommandée à l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque de grippe grave



FIÈVRE JAUNE : Chez la femme allaitante, la vaccination contre la fièvre jaune doit être **reportée tant que le nourrisson n'a pas atteint l'âge de 6 mois**, sauf en cas de situation épidémique